

ПАМЯТКА

Населению по профилактике сибирской язвы

Сибирская язва - одно из наиболее опасных инфекционных заболеваний животных и человека с очень высокой смертностью. Возбудитель сибирской язвы устойчив в окружающей среде. В почве сохраняется десятилетиями. Кипячение убивает споры сибиреязвенного микроба только через 45-60 минут. Эта болезнь известна с древнейших времен. Ежегодно она уносила сотни тысяч жизней и наносила громадный урон животноводству. Длительность и признаки заболевания многообразны. Заболевание поражает как отдельные органы, так и организм в целом. Источником инфекции являются больные сельскохозяйственные животные: крупный рогатый скот, лошади, ослы, овцы, козы, олени, верблюды. Основной путь заражения животных - через корма, воду, больное животное. Сибирская язва у животных характеризуется следующими особенностями:

1. Короткий инкубационный период, обычно не превышающий 3-4 дня;

2. Выраженная клиника в виде лихорадочного состояния, упадка сердечно-сосудистой деятельности, кровавого поноса и рвоты. При молниеносной форме у животных наблюдаются судороги, шаткая походка. Животные падают, изо рта, носа, заднего прохода выделяется кровянистая жидкость. Смерть наступает через 30-60 минут. При других формах с более длительным течением понижается аппетит, снижается удой, молоко приобретает горький вкус, слизистую консистенцию, кремовый или кровянистый оттенок. У стельных животных могут быть аборт. На коже могут появляться холодные и безболезненные отеки. Центр отека постепенно омертвевает и на этом месте появляются язвы. У свиней сибирская язва протекает в виде ангины и сопровождается опуханием шеи. У павших животных кровь дегтярного цвета, не сворачивается. Очень часто она истекает из носа, заднего прохода. Трупное окончание отсутствует или оно слабо выражено.

ЧЕЛОВЕК ЗАРАЖАЕТСЯ от больных животных при уходе за ними, при употреблении в пищу мяса, молока от больных животных, разделки туш, при использовании меховой одежды, инфицированной спорами возбудителя. В зависимости от формы течения болезни у людей может наблюдаться лихорадка, кровавый понос и рвота, боли в животе, заболевание органов дыхания, сердечная слабость, отеки и кожные язвы. Болезнь без лечения чаще всего заканчивается смертью.

ПРОФИЛАКТИКА СОСТОИТ ИЗ:

- своевременного выявления больных животных, учете и обеззараживании мест захоронения сибиреязвенных трупов,

- вакцинация всего восприимчивого поголовья с профилактической целью,

- недопущения вывоза, ввоза животных, а также животноводческой продукции, убоя животных без согласования с государственной ветеринарной службой и при наличии ветеринарных сопроводительных документов.

- незамедлительное оповещение ветеринарных специалистов о случаях заболевания и падеже животных.

- для обеспечения безопасности Вашего здоровья, использование в пищу животноводческой продукции и ее переработка разрешается только после ветеринарно-санитарной экспертизы.

ГРАЖДАНЕ! Приобретая животноводческую продукцию в местах несанкционированной торговли Вы подвергаете себя и своих близких опасности в заражении особо опасными болезнями общими для человека и животных.